



Pr. n. GR 293572 / 11/02

Roma 21.05.2014

Ai Direttori Generali di:

- Aziende USL
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS
- Ospedali classificati
- AIFA

Oggetto: Centri prescrittori e modalità di erogazione del medicinale **Cabazitaxel (JEVTANA®)**;  
aggiornamento della nota 187800 del 28.03.2014.

A seguito della richiesta da parte della Direzione Sanitaria dell'Ospedale Regina Apostolorum inerente il riconoscimento tra i centri abilitati alla prescrizione del medicinale Cabazitaxel (Jevtana®) della Struttura Complessa di Oncologia dello stesso Ospedale, le strutture individuate con la nota GR 187800 del 28 marzo 2014 sono integrate con la struttura sanitaria in questione.

Pertanto, i centri abilitati alla prescrizione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®) risultano essere i seguenti:

1. Az. USL Roma A - P.T.P. Nuovo Regina Margherita
2. Az. USL Roma B -Ospedale Sandro Pertini
3. Az. USL Roma C – Osp. S. Eugenio
4. Az. USL Roma D –Osp. G.B. Grassi di Ostia
5. Az. USL Roma G – Osp. San Giovanni Evangelista
6. Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero San Sebastiano -Frascati;
7. Az. USL Roma H – Ospedale Specializzato “L. Spolverini” - Ariccia
8. Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero di Anzio-Nettuno
9. Az. USL Latina - Ospedale Santa Maria Goretti
10. Az. USL Latina – Osp. Fiorini di Terracina
11. Az. USL Latina – Osp. Dono Svizzero di Formia
12. Az. USL Rieti - Ospedale San Camillo De Lellis
13. Az. USL Viterbo - Ospedale Belcolle
14. Az. USL Frosinone
15. Az. Osp. San Camillo-Forlanini
16. Az. Osp.S. Filippo Neri
17. Az. Osp. Sant' Andrea
18. Az. Osp. Policl. Tor Vergata
19. Policlinico Umberto I
20. Policlinico Agostino Gemelli
21. Policl. Univ. Campus Bio Medico
22. IFO - Istituto Regina Elena
23. Ospedale Regina Apostolorum.

Si precisa che per le indicazioni terapeutiche peculiari del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®) l'utilizzo è riservato esclusivamente agli specialisti oncologi delle strutture sopracitate. I centri utilizzatori sono inoltre tenuti alla compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento disponibile sul sito web dell'AIFA.

Si fa presente inoltre che, come da comunicato AIFA del 26 aprile 2013, il medicinale in questione è ~~soggetto ad un monitoraggio addizionale con cui segnalare eventi avversi riscontrati e~~ come da nota informativa sempre della stessa agenzia AIFA del 5 novembre 2013 ci potrebbero essere dei potenziali errori nella preparazione del medicinale; a tal proposito si allega la nota informativa per evidenziare le corrette istruzioni per la preparazione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®).


I responsabili delle strutture sanitarie in indirizzo sono invitati a dare diffusione della presente nota agli operatori sanitari interessati affinché sia garantita, nel massimo dell'appropriatezza d'uso e nel rispetto di quanto indicato dall'AIFA, l'assistenza farmacologica ai pazienti che potranno essere messi in trattamento con il medicinale di cui in oggetto.

Il Responsabile dell'Area  
d.ssa Lorella Lombardozi

Il Direttore  
Dott.ssa Flori Degrassi



Il responsabile del procedimento  
Dr. Marcello Giuliani  
Tel 06.5168.3738 e-mail [mgjuliani@regione.lazio.it](mailto:mgjuliani@regione.lazio.it)  
19 maggio 2014





Pr. n. GR 187800 / 11/02

Roma 28.3.2014

Ai Direttori Generali di:

- Aziende USL
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS
- Ospedali classificati
- AIFA

Oggetto: Centri prescrittori e modalità di erogazione del medicinale **Cabazitaxel (JEVTANA®)**;  
aggiornamento della nota 93798 del 14 febbraio 2014.

A seguito di richieste pervenute da alcune strutture sanitarie del Lazio inerenti il riconoscimento di centri abilitati alla prescrizione del medicinale Cabazitaxel (Jevtana®), le strutture individuate con la nota GR 93798 del 14 febbraio 2014 sono integrate con:

- Az. USL Roma G – Osp. San Giovanni Evangelista;
- Az. USL Latina – Osp. Fiorini di Terracina;
- Az. USL Latina – Osp. Dono Svizzero di Formia.

Pertanto, i centri abilitati alla prescrizione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®) risultano essere i seguenti:

1. Az. USL Roma A - P.T.P. Nuovo Regina Margherita
2. Az. USL Roma B -Ospedale Sandro Pertini
3. Az. USL Roma C – Osp. S. Eugenio
4. Az. USL Roma D –Osp. G.B. Grassi di Ostia
5. Az. USL Roma G – Osp. San Giovanni Evangelista
6. Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero San Sebastiano -Frascati;
7. Az. USL Roma H – Ospedale Specializzato “L. Spolverini” - Ariccia
8. Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero di Anzio-Nettuno
9. Az. USL Latina - Ospedale Santa Maria Goretti
10. Az. USL Latina – Osp. Fiorini di Terracina
11. Az. USL Latina – Osp. Dono Svizzero di Formia
12. Az. USL Rieti - Ospedale San Camillo De Lellis
13. Az. USL Viterbo - Ospedale Belcolle
14. Az. USL Frosinone
15. Az. Osp. San Camillo-Forlanini
16. Az. Osp.S. Filippo Neri
17. Az. Osp. Sant' Andrea
18. Az. Osp. Policl. Tor Vergata
19. Policlinico Umberto I
20. Policlinico Agostino Gemelli
21. Policl. Univ. Campus Bio Medico
22. IFO - Istituto Regina Elena



REGIONE  
LAZIO

Si precisa che per le indicazioni terapeutiche peculiari del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®) l'utilizzo è riservato esclusivamente agli specialisti oncologi delle strutture sopracitate. I centri utilizzatori sono inoltre tenuti alla compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento disponibile sul sito web dell'AIFA.

Si fa presente inoltre che, come da comunicato AIFA del 26 aprile 2013, il medicinale in questione è soggetto ad un monitoraggio addizionale con cui segnalare eventi avversi riscontrati e come da nota informativa sempre della stessa agenzia AIFA del 5 novembre 2013 ci potrebbero essere dei potenziali errori nella preparazione del medicinale; a tal proposito si allega la nota informativa per evidenziare le corrette istruzioni per la preparazione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®).

I responsabili delle strutture sanitarie in indirizzo sono invitati a dare diffusione della presente nota agli operatori sanitari interessati affinché sia garantita, nel massimo dell'appropriatezza d'uso e nel rispetto di quanto indicato dall'AIFA, l'assistenza farmacologica ai pazienti che potranno essere messi in trattamento con il medicinale di cui in oggetto.

Il Responsabile dell'Area  
d.ssa Lorella Lombardozzi

Il Direttore  
Dot.ssa Flori Degrassi

Il responsabile del procedimento  
Dr. Marcello Giuliani  
Tel 06.5156.5738 e-mail mgiuliani@regione.lazio.it  
24 marzo 2014

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L'AGENZIA EUROPEA DEI  
MEDICINALI (EMA) E L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)**

Novembre 2013



**JEVTANA (cabazitaxel): potenziale errore nella preparazione di Jevtana**

Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,

sanofi-aventis groupe, in collaborazione con l'Agenzia Europea dei Medicinali e l'Agenzia Italiana del Farmaco, vuole ricordarLe le corrette istruzioni per la preparazione di Jevtana (cabazitaxel):

**Riassunto**

- Sanofi è stata recentemente informata di casi di ricostituzione errata di Jevtana (cabazitaxel) che possono portare ad un sovradosaggio, con una reale dose somministrata che è dal 15% al 20% più alta rispetto alla dose prescritta.
- La ricostituzione di Jevtana richiede un processo di diluizione a due fasi. Sia il flaconcino di concentrato di cabazitaxel che il contenuto del flaconcino di solvente comprendono un sovra-riempimento per compensare la possibile perdita di liquido durante la preparazione.
- Il sovra-riempimento assicura che dopo la diluizione del concentrato con **l'intero** contenuto del flaconcino di solvente fornito, ci sia una soluzione diluita iniziale, chiamata "premix" o "miscela concentrato-solvente", contenente 10 mg/ml di Jevtana.
- L'errore nella somministrazione della dose è stato causato da una inappropriata ricostituzione nella prima fase dove il volume nominale del flaconcino solvente (4,5 ml) era trasferito nel flaconcino di concentrato, invece che l'intero contenuto, causando una concentrazione più alta di Jevtana somministrata.
- Le possibili complicanze in caso di sovradosaggio potrebbero essere rappresentate da una esacerbazione di reazioni avverse come soppressione midollare e disturbi gastrointestinali (vedere paragrafo 4.9 dell'RCP).

	Flaconcino di concentrato	Flaconcino di solvente per diluizione
		
Volume nominale	1,5 ml	4,5 ml
Contenuto di cabazitaxel per volume nominale	60 mg cabazitaxel	
Reale volume di riempimento	1,83 ml	5,67 ml

Contenuto di cabazitaxel per volume di riempimento	73,2mg cabazitaxel	
--	--------------------	--

### Appropriate istruzioni di preparazione

La corretta preparazione della soluzione per infusione di Jevtana richiede un processo di diluizione a due fasi.

- 1- **Diluizione iniziale del concentrato: trasferire sempre l'intero contenuto del flaconcino di solvente** nel concentrato al fine di raggiungere la concentrazione di 10 mg/ml nel "premix".
- 2- **Preparazione della soluzione per infusione:** da questo "premix" prelevare il volume richiesto e iniettare nella sacca di infusione in accordo con le dosi stabilite di Jevtana che devono essere somministrate al paziente.

Nel caso in cui venga utilizzato un software automatico per preparare la preparazione, deve essere garantito che il sistema sia stato ottimizzato per prelevare l'intero contenuto del flaconcino di solvente da aggiungere al flaconcino di concentrato, per assicurare una concentrazione di 10 mg/ml nel "premix".

### Ulteriori informazioni

Jevtana 60 mg concentrato e solvente per soluzione per infusione è stato approvato nell'Unione Europea il 17 Marzo 2011 ed è indicato in combinazione con il prednisone o il prednisolone per il trattamento del carcinoma della prostata metastatico ormone-refrattario (mHRPC), in pazienti trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel. Il prodotto è stato commercializzato in Europa nell'Aprile 2011.

Informazioni dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA): <http://www.ema.europa.eu/ema/>

Condivida queste informazioni con i colleghi interessati e gli operatori sanitari.

### Richiamo alla segnalazione

I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa associata a medicinali contenenti ferro per via endovenosa.

I medici e gli altri operatori sanitari devono, a norma di legge, trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda cartacea (reperibile sul sito [http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo\\_filecb84.pdf](http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf)) o compilando on line la scheda elettronica

([http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda\\_aifa\\_operatore\\_sanitario16.07.2012.doc](http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_aifa_operatore_sanitario16.07.2012.doc)) tempestivamente, al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o, qualora operanti in strutture sanitarie private, tramite la Direzione sanitaria, al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio.

In caso di dubbi o di richiesta di ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare i seguenti recapiti: telefono 800.536389; sitoweb [www.sanofi.it](http://www.sanofi.it), area contatti.

Cordialmente,

Dott. Marco Scatigna

Direttore Scientifico e Medico

L'AIFA coglie l'occasione per ricordare a tutti gli Operatori Sanitari l'importanza della segnalazione delle reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego. Le Segnalazioni di Sospetta Reazione Avversa da Farmaci devono essere inviate al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza dell'Operatore

stesso. La presente Nota Informativa viene anche pubblicata sul sito dell'AIFA ([www.agenziafarmaco.it](http://www.agenziafarmaco.it)) la cui consultazione regolare è raccomandata per la migliore informazione professionale e di servizio al cittadino.

Pr. n. GR 93798/ 11/02

Roma 14.02.2014

Ai Direttori Generali di:

- Aziende USL
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS
- Ospedali classificati
- AIFA

Oggetto: Centri prescrittori e modalità di erogazione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®);  
aggiornamento febbraio 2014

A seguito di richieste pervenute da alcune strutture sanitarie del Lazio inerenti il riconoscimento di centri abilitati alla prescrizione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®), le strutture precedentemente individuate con la nota GR 25908 del 16 gennaio 2014, sono integrate con:

Az. USL Roma C – Osp. S. Eugenio

Az. USL Roma D – Osp. G.B. Grassi di Ostia

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli via Cassia

Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero San Sebastiano -Frascati;

Az. USL Roma H – Ospedale Specializzato “L. Spolverini” - Ariccia

Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero di Anzio-Nettuno

Pertanto, i centri abilitati alla prescrizione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®) risultano essere i seguenti:

1. Az. USL Roma A - P.T.P. Nuovo Regina Margherita
2. Az. USL Roma B -Ospedale Sandro Pertini
3. Az. USL Roma C – Osp. S. Eugenio
4. Az. USL Roma D –Osp. G.B. Grassi di Ostia
5. Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero San Sebastiano -Frascati;
6. Az. USL Roma H – Ospedale Specializzato “L. Spolverini” - Ariccia
7. Az. USL Roma H – Presidio Ospedaliero di Anzio-Nettuno
8. Az. USL Latina - Ospedale Santa Maria Goretti
9. Az. USL Rieti - Ospedale San Camillo De Lellis
10. Az. USL Viterbo - Ospedale Belcolle
11. Az. USL Frosinone
12. Az. Osp. San Camillo-Forlanini
13. Az. Osp.S. Filippo Neri
14. Az. Osp. Sant' Andrea
15. Az. Osp. Policl. Tor Vergata
16. Policlinico Umberto I
17. Policlinico Agostino Gemelli
18. Policl. Univ. Campus Bio Medico
19. IFO - Istituto Regina Elena

Si precisa che per le indicazioni terapeutiche peculiari del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®) l'utilizzo è riservato esclusivamente agli specialisti oncologi delle strutture



sopracitate. I centri utilizzatori sono inoltre tenuti alla compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento disponibile sul sito web dell'AIFA.

Si fa presente inoltre che, come da comunicato AIFA del 26 aprile 2013, il medicinale in questione è soggetto ad un monitoraggio addizionale con cui segnalare eventi avversi riscontrati e come da nota informativa sempre della stessa agenzia AIFA del 5 novembre 2013 ci potrebbero essere dei potenziali errori nella preparazione del medicinale; a tal proposito si allega la nota informativa per evidenziare le corrette istruzioni per la preparazione del medicinale Cabazitaxel (JEVTANA®).

I responsabili delle strutture sanitarie in indirizzo sono invitati a dare diffusione della presente nota agli operatori sanitari interessati affinché sia garantita, nel massimo dell'appropriatezza d'uso e nel rispetto di quanto indicato dall'AIFA, l'assistenza farmacologica ai pazienti che potranno essere messi in trattamento con il medicinale di cui in oggetto.

Il Responsabile dell' Area  
d.ssa Lorella Lombardozzi

Il Direttore  
Dott.ssa Flori Degrassi