

Studi randomizzati non ancora pubblicati (pre-print) sull'efficacia comparativa dei trattamenti farmacologici per il trattamento delle persone affette da COVID-19

Studio	Paese	Popolazione	Riferimento
Chen C et al. 2020	Cina	236 pazienti Gruppo 1: favipiravir+ +Trattamento standard Gruppo 2: Umifenovir +Trattamento standard	https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037432
Fang Zheng 2020	Cina	N=89 Gruppo 1: Novaferon, Gruppo 2: Novaferon +Lopinavir/Ritonavir Gruppo 3: Lopinavir/Ritonavir group	doi.org/10.1101/2020.04.24.20077735
Esquivel-Moynelo 2020	Cuba	N=63 Gruppo 1: Interferon alfa 2b Gruppo 2: Trattamento standard	medRxiv. 2020:2020.07.29.20164251
Cheng-Pin 2020	Taiwan	N=33 Gruppo 1: Idrossiclorochina + trattamento standard Gruppo 2: trattamento standard	https://doi.org/10.1101/2020.07.08.20148841

Studio	Paese	Popolazione	Riferimento
Lan Chen 2020	Cina	<p>Gruppo 1: cloroquina (1000 mg QD al giorno 1, poi 500 mg QD per 9 giorni) + trattamento standard</p> <p>Gruppo 2: idrossiclorochina (200 mg BID per 10 giorni) + trattamento standard</p> <p>Gruppo 3: Trattamento standard (protocollo clinico cinese per la diagnosi e il trattamento della polmonite da coronavirus)</p>	https://doi.org/10.1101/2020.06.19.20136093
Gharbharan A et al. 2020	Olanda	<p>Gruppo 1 (n=43) plasma ConvP Sanquin Blood Supply (300 ml per via endovenosa) il giorno dell'inclusione + trattamento standard;</p> <p>Gruppo 2 (n=43) Trattamento standard (SC, a seconda dell'ospedale, uso off-label di farmaci approvati dall'EMA (ad es. cloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, tocilizumab, anakinra)</p>	https://doi.org/10.1101/2020.07.01.20139857

Studio	Paese	Popolazione	Riferimento
Mansour 2020	Brasile	<p>N=30</p> <p>Gruppo 1: icatibant (30 mg [3.0 ml di soluzione 10 mg/ml] ad intervalli di 8 ore)+Trattamento standard</p> <p>Gruppo 2: inibitore C1 esterasi/callicreina (20 UI/kg di peso corporeo il giorno 1 poco dopo il reclutamento e il giorno 4 (ogni fiala contiene 500 UI di C1 esterasi/ inibitore della callicreina come prodotto liofilizzato per la ricostituzione con 10 ml di acqua sterile per iniezione) +Trattamento standard</p> <p>Gruppo 3: Trattamento standard</p>	https://doi.org=/10.1101/2020.08.11.20167353
Mehboob 2020	Pakistan	<p>Gruppo 1: Aprepitant (capsula 80mg una volta al giorno come aggiunta per 3-5 giorni);</p> <p>Gruppo 2: trattamento standard</p>	https://doi.org/10.1101/2020.08.01.20166678

Aggiornamento al 07/09/2020