

<p>Sono disponibili le analisi aggiuntive per strutture ospedaliere e per area di residenza aggiornate a luglio 2012 per i seguenti indicatori inclusi nel programma di implementazione:</p> <p>◆</p> Proporzione di IMA trattati con PTCA entro 48 ore dal ricovero. Proporzione di IMA STEMI trattati con PTCA entro 48 ore dal ricovero. Proporzione di Interventi chirurgici per frattura del collo del femore nell'anziano eseguiti entro 48 ore dal ricovero. Proporzione di ricoveri per colecistectomia laparoscopica gravati da complicanze entro 30 giorni dalla data di intervento. Proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria entro 3 giorni dall'intervento di colecistectomia laparoscopica. Proporzione di colecistectomie laparoscopiche sul totale delle colecistectomie. <p>Attualmente gli indicatori ◆Mortalità a 30 giorni dal ricovero per un episodio di IMA◆ e ◆Proporzione di parti con taglio cesareo primario◆ non possono essere calcolati per il mancato aggiornamento dei sistemi informativi della mortalità e dei Certificati di Assistenza al Parto (CedAP).</p> <p>Sono disponibili analisi aggiuntive per reparto aggiornate a luglio 2012 per gli indicatori:</p> Proporzione di ricoveri per colecistectomia laparoscopica gravati da complicanze entro 30 giorni dalla data di intervento. Proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria entro 3 giorni dall'intervento di colecistectomia laparoscopica. Proporzione di colecistectomie laparoscopiche sul totale delle colecistectomie. <p>◆</p> <p>P.Re.Val.E. 2012</p>