

 Il DEP Lazio ha partecipato a una revisione sistematica della letteratura con l'obiettivo di valutare in quali contesti, per quali patologie croniche o oncologiche la condivisione della scelta del sito dove posizionare i cateteri venosi centrali (CVC), consenta di ridurre gli eventi avversi di CLABSI e CRIBSI (infezioni ematiche associate alla linea centrale e al catetere) in adolescenti e giovani adulti.

È stata condotta una ricerca sistematica su MEDLINE, CINAHL, CENTRAL, SCOPUS, Cochrane Library e Web of Science, fino a dicembre 2019, che ha identificato 19 studi eleggibili. Nessuno di questi studi rispondeva ai criteri di inclusione definiti nel quesito di ricerca, pertanto il risultato è una revisione sistematica che non include studi pertinenti (empty review).

Tutto ciò sottolinea il bisogno urgente di disegnare e condurre trial clinici e studi di coorte con protocolli clinici che identifichino esiti sia quantitativi che qualitativi, coinvolgendo adolescenti e giovani adulti con patologie croniche e oncologiche. Ci si attende che tali approcci di condivisione delle strategie terapeutiche con i pazienti vengano standardizzati nel processo di cura per ridurre gli eventi CLABSI e CRIBSI.

[Clicca qui per andare al link della pubblicazione.](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35114837/)