<img style="float: left;" alt="heart-7819108 640" src="images/stories/heart-7819108_640.jpg" height="88" width="131" />Un gruppo di lavoro a cui ha preso parte il DEP ha sviluppato una serie di indicatori per valutare la qualit&#65533;dell'assistenza ai pazienti ricoverati per scompenso cardiaco. Per verificare l'efficacia di questi indicatori, &#65533;stata condotta una ricerca su 41.406 pazienti con un'et&#65533;media di 77 anni, ricoverati in quattro regioni italiane (Lombardia, Marche, Lazio e Sicilia) tra il 2014 e il 2015. Nei 5 anni di follow-up si &#65533;valutata l'aderenza alle raccomandazioni terapeutiche e si sono esaminati gli esiti clinici e i costi sanitari. I risultati hanno mostrato che i pazienti che seguivano le raccomandazioni terapeutiche ritardavano l&#65533;insorgenza degli esiti negativi e avevano costi sanitari pi&#65533; bassi. Si &#65533;quindi concluso che il monitoraggio stretto dei pazienti con insufficienza cardiaca e il rispetto delle terapie raccomandate dovrebbero essere prioritari nelle linee guida nazionali. <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38725148/">Clicca qui per andare al link della pubblicazione</a>.