Nell&#65533;ambito del progetto CAESAR &#65533;stato realizzato uno studio con lo scopo di descrivere l'uso delle terapie farmacologiche e non farmacologiche, e indagare i fattori determinanti dell'uso del riluzolo nei pazienti con nuova diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) in Lazio, Toscana e Umbria. Tra il 2014 e il 2019 sono stati identificati 1636 pazienti con nuova diagnosi di SLA, per lo pi&#65533; di et&#65533;compresa tra 65 e 74 anni, con un'alta prevalenza di comorbidit&#65533; Alla data di prima diagnosi, il 27.4% dei pazienti usava riluzolo, con un aumento significativo nel primo anno. Anche l&#65533;uso di terapie sintomatiche &#65533;aumentato nei 12 mesi successivi alla diagnosi, sia tra gli utilizzatori di riluzolo che tra i non utilizzatori. Pazienti pi&#65533; gravi avevano una minore probabilit&#65533;di essere trattati con riluzolo.
 Le ricerche future dovrebbero includere aree geografiche pi&#65533; ampie, possibilmente oltre l'Italia, per aumentare la potenza statistica e confrontare i modelli tra aree, migliorando la validit&#65533;dei risultati. Clicca qui per andare al link della pubblicazione.